

Évente, a világban,  
több mint

**600.000**

eset van  
diagnosztizálva.

## 5 ÉVES TÚLÉLÉSI ARÁNY

KORAI  
DIAGNÓZIS



**91%**

KÉSŐI  
DIAGNÓZIS



**16%**

## KI VAN KITÉVE A MÉHNYAKRÁK KOCKÁZATÁNAK ?

Minden nő, függetlenül a  
faji/etnikai hovatartozástól, ki  
van téve a méhnyakrák  
kialaklásának kockázatának



A LEGGYAKRABBAN  
DIAGNOSZTIZÁLT NŐK

**35-44 ÉVESEK**

### MI OKOZZA A MÉHNYAKRÁKOT ?

**LEGGYAKORIBB OKOZÓJA**  
HPV (HUMÁN PAPILOMA VÍRUS)



A méhnyakrák több, mint  
90%-át a HPV való  
fertőzések okozzák.  
Az emberek több, mint  
80%- a életében  
megfertőződik HPV-vel, de  
a legtöbbször nem alakul  
ki méhnyakrák.

### MELYEK A TÜNETEK ?

A méhnyakrák korai  
szakaszában  
általában nincsenek  
tünetek.

**HA A RÁK  
ELŐREHALADT**


A tünetek a következők  
lehetnek:

**RENDELLENES HÜVELYI  
VÉRZÉS**  
**RENDELLENES HÜVELY  
FOLYÁS**  
**FÁJDALOM A  
SZEXUÁLIS  
ÉRINTKEZÉSKOR**

### MIÉRT FONTOS A SZŰRÉS ?

**6 A 10 -BŐL**  
**MÉHNYAKRÁK**

OLYAN NŐKNÉL  
ÉSZLELIK AKIK SOHA  
NEM VÉGEZTEK  
BABEȘ-PAPANICOLAU  
TESZTET  
vagy az elmúlt 5 évben  
nem vizsgálták.



Több, mint  
**85%**  
AZ ÉRINTETT NŐK KÖZÜL  
FIATALOK,  
alacsony iskolai  
végzettséggel, a világ  
legszegényebb  
közösségeiből .

**90%** A  
HALÁLESETEKNEK ,  
alacsony és közepes  
jövedelmű  
országokban fordul  
elő.

A méhnyakrák életkor (A) szerinti előfordulási és halálozási (B) arányai országonként 2020-ban.  
GLOBOCAN adatbázis, Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC), the Global Cancer Observatory

Évente  
DIAGNOSZTIZÁLV  
A VAN TÖBB, MINT  
**600.000**  
Eset.

**19**

20-ból 19 a  
leginkább  
érintett  
országok  
Afrikából  
vannak.

A méhnyakrák  
**MEGÖL TÖBB, MINT**  
**300.000**  
NŐT ÉVENTE.

Éves új esetek  
száma  
NŐNI FOG  
**700.000**  
Esettel

**BECSLÉSEK  
SZERINT  
cselekedetek nélkül  
2030-ig**

Éves elhalálozások  
száma  
NŐNI FOG  
**400.000**  
Esetig.