



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ COVASNA

✉ 520023 Sf. Gheorghe
Str. Gödri Ferenc nr. 12

☎ 0267.351.398
☎ 0267.351.380

E-mail: dsp@dspcovasna.ro
Web: www.dspcovasna.ro

Nr. înreg. 3709
Data 30.06.2025
Nr. arhivă II.B.4.

Către,

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL COVASNA

Referitor: Măsurile de control al vectorilor în vederea prevenirii îmbolnăvirilor cauzate de aceștia în rândul populației; măsuri ce pot fi întreprinse de către populație

În perioada din 02.06 – 31.10.2025 suntem în perioada de risc a infecțiilor West Nile Virus.

Conform Metodologiei de supraveghere a infecției cu West Nile Virus – Sezon 2025, emis de către Institutul Național de Sănătate Publică – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, controlul bolii poate fi realizat prin măsuri de control a vectorilor (țânțarilor) și educația populației în ceea ce privește autoprotecția și cooperarea la programele prevenționale.

În anul 2018 am avut un caz de neuroinfecție cu virusul West Nile, cu evoluție nefavorabilă, soldându-se cu deces, motiv pentru care în lunile iunie-iulie ale anului 2019 s-au întreprins măsuri de combatere a vectorilor la sol și din aer.

Pe lângă acesta, prezența țânțarului tigru asiatic (*Aedes albopictus*) în țara noastră și cazurile de febră Dengă de import în același timp pot duce la apariția endemică a acestei boli (transmitere locală a infecției).

Atașăm prezentei date suplimentare și grafice despre West Nile și Dengă, respectiv Anexa nr. 4 a Metodologiei, cu informații și recomandări generale pentru populație privind țânțarii.

Având în vedere cele menționate, propunem demararea acțiunilor de combatere a vectorilor – dezinsecție pe raza județului și **educarea populației pentru împiedicarea înmulțirii țânțarilor**.

Puteți găsi informații care pot fi diseminate către populație pe pagina de Facebook a Direcției de Sănătate Publică Covasna: <https://www.facebook.com/dspcovasna>

Pentru a consulta metodologia de supraveghere a infecției cu West Nile Virus – Sezon 2025, puteți accesa pagina web

https://insp.gov.ro/download/metodologia-de-supraveghere-a-infectiei-cu-wn_2025/?wpdmdl=131078&refresh=68626cdb36de31751280859



Cu considerație,

Director executiv
Ec. Ágoston László

Medic specialist epidemiologie
dr. Farkas-Jakó József



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ COVASNA

Informații și recomandări generale pentru populație

Ce trebuie să știm despre țânțari?

Țânțarii transmit agenți patogeni care produc îmbolnăviri la om și la animale. Bolile cele mai răspândite sunt arbovirozele, dintre acestea făcând parte și infecția cu virusul West Nile. Pentru a-și depune ouăle femelele de țânțari se hrănesc cu sânge. În timp ce se hrănesc cu sânge ele se infectează cu agenți patogeni de la animale sau om sau îi transmit acestora. Țânțarii trăiesc și se dezvoltă în preajma noastră, unde îi găsim fie sub formă de larve (ouă), fie sub formă adultă.

Larvele de țânțari se găsesc:

- În apa acumulată în subsolurile blocurilor;
- În apa care nu se scurge din canalizarea înfundată;
- În bălțile care se formează în apropierea locuințelor, din apa care curge din conductele sparte și din alte instalații neîntreținute;
- În apa de ploaie păstrată în butoaie/vase în curte;
- În apa acumulată în recipiente vechi aruncate la întâmplare în preajma locuințelor (cutii de conserve, cauciucuri de automobile, jucării etc);
- În apa din gropile și șanțurile de pe șantiere sau din locuri unde s-a lucrat la instalații;

Țânțarii adulți zboară în preajma locuințelor, mai ales dimineața devreme sau în amurg, căutând posibilitatea de a se hrăni cu sânge. Țânțarii, pentru a se hrăni cu sânge, intră în locuințe prin ferestrele lăsate deschise, prin casa scârilor, prin orificiile de aerisire unde pot rămâne peste noapte.

În timpul zilei se adăpostesc în locuințe, subsoluri, poduri, cotețe, grajduri, magazii, frunzișul copacilor.

Cum putem împiedica țânțarii să se înmulțească în preajma noastră?


- Prin evacuarea apei din subsoluri;
- Prin repararea instalațiilor de apă și canalizare din subsoluri și din apropierea locuințelor;
- Prin renunțarea la păstrarea apei în butoaie în curte sau să le protejăm de accesul țânțarilor acoperindu-le bine cu capace potrivite;
- Prin evitarea aruncării la întâmplare a obiectelor care nu ne mai trebuie și în care apa poate stagna (cutii de conserve, cauciucuri de automobile, jucării etc);
- Prin îndepărtarea permanentă a gunoaielor menajere în care se adăpostesc țânțarii.

Cum să evităm înțepăturile de țânțari?

- purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, dacă ieșim seara din locuințe sau ieșim seara în parc la plimbare sau când mergem în pădure, la pescuit, în Delta;
- utilizând substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor (DEET, icaridin/ picardin, IR 3535), în concordanță cu instrucțiunile de pe etichetă, pe care să le aplicăm pe părțile descoperite ale corpului;
- împiedicând pătrunderea țânțarilor în casa (plase protecție la ferestre/uși);
- utilizând substanțe insecticide în locuința/în jurul locuinței;
- utilizând în locuință aerul condiționat;
- utilizând plase împotriva țânțarilor în jurul paturilor în cazul în care nu sunt disponibile celelalte măsuri menționate anterior sau dacă dormiți în aer liber.
- acoperind pătuțul copilului sau căruciorul cu plase împotriva țânțarilor.


Mesaje pentru populație


- Cel mai bun mod de a preveni boala cu virusul West Nile este evitarea mușcăturilor de țânțari.
- Folosiți substanțe repelente (aplicate pe piele și haine) când mergeți în aer liber.
- Purtați mâneci lungi și pantaloni în zori și amurg.
- Reparați sau instalați paravane pe ferestre și uși.
- Folosiți aer condiționat, dacă îl aveți.
- Îndepărtați sursele de țânțari din jurul casei dvs.




Incidența anuală a infecției cu virusul West-Nile, România, 1996-2023

2022





Distribuția numărului de cazuri de febră Denga, România, 2013-2023



Prezența țânțarului tigru asiatic în Europa