

ELŐZZE MEG A SARS-COV-2 VÍRUSSAL A MUNKAHELYEN VALÓ MEGFERTŐZŐDÉST!



VISELJE HELYESEN A MASZKOT AZ INTÉZMÉNY MINDEN HELYISÉGÉBEN A MUNKAHELYÉN VALÓ JELENLÉTÉNEK TELJES IDŐTARTAMA ALATT. A MASZKNAK FEDNIE KELL A SZÁJAT ÉS AZ ORROT EGYARÁNT.

- Fertőtlenítse kezeit alkohol alapú oldattal vagy vízzel és szappannal a maszk felhelyezése előtt. A maszknak fednie kell a szájat és az orrot egyaránt.
- 4 óránként cserélje a maszkot vagy akárhányszor ez átnedvesedett vagy megrongálódott.
- Ne érintse meg a maszkot viselés közben; a maszk megérintése esetén a kezeket előtte fertőtleníteni kell alkohol alapú oldattal vagy vízzel és szappannal.
- Használat után azonnal dobja el a maszkot egy lehetőleg fedéllel rendelkező szemétkosárba és ezt követően fertőtlenítse kezeit.
- Ne használja ismételten az orvosi maszkokat, amennyiben ez lehetséges.
- Hordjon maszkot nyitott tereken és otthon is láz, köhögés és tüsszögés megjelenése esetén.

**VEGYEN RÉSZT AZ AZ INTÉZMÉNY ÉPÜLETÉNEK BEJÁRATÁNÁL
LEVŐ EPIDEMIOLOGIAI EGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLYOZÁSON ÉS
FERTŐTLENÍTSE KEZEIT!
EGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLYOZÁSON ÉS
FERTŐTLENÍTSE KEZEIT!**



Az egészségügyi osztályozás nem jár a személy jellegű adatok bejegyzésével és a következőkből áll:

- A hőmérséklet megmérése érintkezés nélküli hőmérővel (a jegyzett hőmérséklet nem haladhatja meg a 37,3°C értéket), amelyhez hozzáadódik a készülék tájékoztatójában foglalt hibahatár;
- A légúti jelek és tünetek megfigyelése (típus: gyakori köhögés, gyakori tüsszentés, elváltozott általános állapot);
- Amennyiben a jegyzett hőmérséklet meghaladja a 37,3°C értéket, javasolt a hőmérséklet megmérésének megismétlése, 2-5 percnyi pihenő után;
- Ha megállapítást nyer a hőmérséklet 37,3°C érték feletti megmaradása és/vagy megállapítást nyer más légúti tünetek jelenléte, a személy a csaláadorvoshoz vizsgálatra elküldésre kerül.

Forrás: Egészségügyi Minisztérium 3577/831/2020 Rendelete



Egészségügyi
Minisztérium



Országos
Közegészségügyi Intézet



Egészségfejlesztés és -Értékelés
Országos Központja