

Mai multe informații:

**Direcția de Sănătate Publică**

520023 Sf. Gheorghe

Str. Gödri Ferenc nr. 12

**Compartimentul Promovarea Sănătății**

Tel. 0267 351398

e-mail: [dsp@dspcovasna.ro](mailto:dsp@dspcovasna.ro)



**Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf**  
**Cabinetul Planificare Familială din Ambulatoriul de Specialitate**  
520023 Sf. Gheorghe  
Str. Stadionului nr. 1  
**Dr. Popescu Carmen**  
Tel. 0267 351398



**Promovarea  
principalelor metode  
contraceptive și planificarea familială**



## **7 mituri despre anticoncepționale**

**Mitul 1:** Anticoncepționalele sunt sigure 100%. Fals! Anticoncepționalele nu pot să te protejeze de boile cu transmitere sexuală (cu excepția prezervativului), iar eficiența anticoncepționalelor este în jur de 99,7% cu anumite variații în funcție de tipul acestora. Nici o metodă contraceptivă nu îți poate garante siguranța 100% împotriva sarcinilor nedorite (poate doar abstința totală sau sterilizarea chirurgicală).

**Mitul 2:** În administrarea de anticoncepționale sunt necesare pauze. Fals! Ideea că trebuie să-i acorzi organismului tău o perioadă de „odihnă” în ceea ce privește administrarea pilulelor este una din cele mai greșite concepții. Practic, organismul ia o pauză în fiecare lună când ai menstruație. Nici măcar această pauză nu este absolut necesară din punct de vedere medical.

**Mitul 3:** Dacă iau anticoncepționale mă îngraș. Nu este adevarat. La unele femei se poate observa o ușoară creștere în greutate, datorită reținerii de apă de către estrogen. De exemplu, pilulele cu drospirenonă (YASMIN) previn reținerea apei în organism. Fiecare organism reacționează în mod diferit la pilulele anticoncepționale administrate.

**Mitul 4:** Administrarea pilulelor contraceptive va duce la apariția petelor și acneei. Este adevărat că în unele cazuri, unele anticoncepționale pot amplifica unele probleme ale tenului și implicit a acneei, dar de obicei pilulele contraceptive au un efect pozitiv asupra tenului. Pilula cu drospirenonă conține un nou hormon sintetic, drospirenonă, cu "efect antiandrogenic", de stimulare a secreției glandelor seboreice ce induce apariția acneei.

**Mitul 5:** Se pot lua anticoncepționale împreună cu alte medicamente. Antibioticile, antidepresivele, etc. pot împiedica ca pilulele anticoncepționale să-și mai facă efectul. De aceea, înainte de a începe să administrezi alte medicamente spune-i farmacistului că ieși anticoncepționale.

**Mitul 6:** Anticoncepționalele dau foarte multe efecte secundare. Partial fals! În primele luni de administrare (de obicei 3 luni) la majoritatea femeilor apar diverse efecte secundare dar după ce organismul s-a obișnuit, efectele adverse ar trebui să dispară, de aceea este recomandat ca anticoncepționalele să scădească doar în urma unui consult la un medic specialist.

**Mitul 7:** Administrarea pilulelor contraceptive duce la infertilitate. Contra credinței populare, nu există legătură între problemele de fertilitate și folosirea pe termen lung a pilulelor contraceptive. Pilula contraceptiva este o metodă reversibilă de contracepție și multe femei care au rămas însărcinate după ce au întrerupt administrarea pilulelor pot susține aceasta afirmație.

## Contracepția de urgență



Se utilizează în situații de urgență pentru a preveni o sarcină nedorită în urma unui contact sexual neprotejat sau protejat necorespunzător și este reprezentată de:

- pilule care se administrează în primele 3 zile (estro-progestative și cele numai pe bază de progestageni).
- dispozitive intrauterine din cupru în primele 5 zile după contactul sexual neprotejat. Previne ovulația, fertilizarea și/sau implantarea.

Cu cât întârzie mai mult folosirea anticoncepționalelor de urgență, cu atât eficacitatea scade. Utilizate corect, au o eficacitate de 99%. Utilizarea frecventă a acestui tip de contracepție crește riscul de sarcină.

### Indicații:

- în urma unui contact sexual neprotejat: când nu s-a folosit nici o metodă de contracepție, un incident în cadrul unei metode contraceptive.

### Avantaje:

- pilulele cu progestagen au efecte secundare mai reduse față de COC
- dispozitivul intrauterin poate fi folosit pe termen lung.

### Dezavantaje:

- efecte secundare: greață, vărsături, dereglați ale menstruației, tensiune la nivelul sănilor, céfalee, amețeli
- dispozitivul intrauterin necesită prezența medicului specialist
- nu protejează împotriva bolilor cu transmitere sexuală

**Contraindicații ale pilulei:** sarcină sau suspiciune de sarcină, femeie cu antecedente de tromboembolism sau migrenă focală.

### Importanța metodelor contraceptive:

- reducerea numărului de decese materne, prevenirea sarcinii nedorite și reducerea numărului de avorturi, îndeosebi la tinere,
- tipurile orale combinate determină reducerea ascuțințelor inflamatorii pélvine prin scăderea anemiei, reducerea intensității

durerilor menstruale, prevenirea anumitor tipuri de cancer,

• prezerervative, spermicide, diafragme și cupole au rol în prevenirea bolilor cu transmitere sexuală și a altor infecții.



### Tipuri de metode contraceptive:

orale, injectabile, implante, sterilizare, dispozitive intrauterine, prezerervative, spermicide, diafragme, cupole cervicale, vasectomie, metode de recunoaștere a perioadei fertile, metoda amenorrei de lactație (MAL), abstinență periodică.



### Criterii de alegere a metodei contraceptive:

#### Între 20-30 de ani: prezerativul și contraceptivele orale

În jurul vîrstei de 20 de ani, în perioada de maximă fertilitate, se recomandă folosirea prezerativului, fiind singura metodă contraceptivă care previne o sarcină nedorită și împiedică transmiterea bolilor sexuale. Se poate opta și pentru contraceptivele orale, potrivite doar pentru persoanele care au o relație stabilă, întrucât nu previn BIS-urile: pilula combinată, pe bază de estrogen și progesteron (cu 99% protecție contra unei sarcini nedorite), pilula de a doua zi (în cazul unui contact sexual neprotejat).

#### Între 30-40 de ani: pilula monohormonală ori dispozitivul intrauterin

După vîrstă de 30 de ani, femeile au la dispoziție: contraceptivele orale combinate, pilula monohormonală și dispozitivul intrauterin. Pilula monohormonală (numai pe bază de progesteron), care poate fi administrată chiar și în perioada alăptării și până la perimenopauză. Dispozitivul intrauterin poate fi pe bază de cupru, cu o eficiență de 99%, sau cel care conține levonorgestrel, un hormon cu eliberare lentă care imită efectele progesteronului. În cazul în care este agreat, dispozitivul poate fi menținut de la 5 până la 8 ani. Cu toate acestea, în ambele tipuri de contracepție pot apărea efecte secundare, precum tulburări ale ciclului menstrual, anexită, cervicită, chiar sarcină extrauterină.


#### Peste 40 de ani: implantul subdermic sau contraceptivele injectabile

Odată cu înaintarea în vîrstă, contracepția orală este tot mai puțin indicată, mai ales la fumătoare. O metodă eficientă de contracepție după această

vârstă este implantarea sub piele, în partea superioară a brațului, a șase capsule, ce conțin progesteron. Hormonul se eliberează treptat în sânge, în cantități foarte mici, asigurând astfel protecție împotriva sarcinilor nedorite. și contraceptivele injectabile sunt o soluție, dar pot fi folosite doar de către cele care nu suferă de depresie și tulburări hepatice. Altă metodă este sterilizarea trompelor, o procedură care constă în legarea trompelor uterine. Spre deosebire de alte metode contraceptive, sterilizarea trompelor nu afectează apetitul sexual, actul sexual și menstruația.

## B. Sterilizarea feminină

ocluzia sau secționarea bilaterală a trompelor uterine.



### **Indicații:**

- afecțiuni care contraindică sarcina sau folosirea altor metode de planificare familială (afecțiuni psihiatricce și neurologice ireversibile)
- femei cu cecariene multiple în antecedente

### **Contraindicații:**

- sarcină, infecții pelviene acute, peritonite, infecții acute sistemicce, afecțiune hepatică acută, infecții tegumentare în zona intervenției, boli cu transmitere sexuală cu cervicită purulentă, afecțiune cardiovasculară acută, anemie, afecțiune respiratorie acută

- sarcină anterioară complicată, hipertensiune.

- evaluare specială - antecedente de afecțiuni cardiaice, afecțiuni respiratorii cronice, hipertensiune, diabet zaharat, tulburări de coagulare, anemie moderată, afecțiuni hepatice cronice, endometrioza, antecedente de boli inflamatorii pelvine, antecedente de intervenții chirurgicale abdominale sau pelviene cu complicații, obezitate marcată (peste 80 kg), hernie omobilicală.

**Complicații:** hemoragie intraperitoneală, infecții pelvine sau peritoneale, hematoame, sângerări și infecții la nivelul plăgii operatorii, lezările formațiunilor anatomicce din zonă (uter, intestin sau vezică), embolii.

## **Sterilizarea chirurgicală feminină și masculină**

Este reprezentată de tubectomie, ocluzie sau ligatură tubară și vasectomie.

**A. Sterilizarea masculină** - blochează fie ductele spermaticice (vasele deferente), fie oviductele (trompele uterine), făcând imposibil contactul dintre spermatozoizi și ovule.



### **Indicații:**

- cei care nu mai doresc copii
- boli actuale sau în antecedente.

### **Contraindicații:**


- bărbați cu infecții locale sau sistemice acute
- evaluare specială – hidrocel sau varicocele, hernie inghinală, clefantiazis, testicol necoborât sau antecedente de ectopic testicular, formațiune tumorală intrascrotal, anemie severă, tulburări de coagulare sau tratament cu anticoagulanți

**Complicații:** sângerări intraoperatorii, reacții la anestezicul local, supurații postoperatorii scrotale, hematoame, infecții și ulterior epididimite congestive, granuloame.

**Metodele naturale** perioada fertilă și nu necesită sfatul unui cadru medical.

### **(tradiționale) de planificare**

**familială** se bazează pe ovulație și evitarea contactelor sexuale în



Tipuri: metoda calendarului, coitus interruptus, metoda temperaturii bazale, a ovulației (secreției vaginale), alăptarea.

**Coitus interruptus** este cea mai veche și mai utilizată metodă naturală contraceptivă din lume.

**Metoda calendarului (abstinență sexuală)** se bazează pe modificările ce apar în organele genitale în timpul menstruației. Socotind 5 zile de supraviețuire a spermatozoidului și 24 – 48 ore pentru ovul, se stabilesc începutul și sfârșitul fazei fertile. Se determină cel mai scurt și cel mai lung ciclu în ultimele 6 sau 12 luni, se scade cifra 19 din ciclul cel mai scurt, rezultând prima zi a fazei fertile și se scade 11 din ciclul cel mai lung, obținându-se ultima zi. Durata ciclurilor poate varia și ca urmare calculul diferă, determinând prelungirea perioadei de abstinență, din care cauză metoda este evitată sau folosită în combinație cu altă metodă de planning familial.

### **Avantaje:**

- nu are efecte secundare
- nu influențează fiziologia organismului
- implică responsabilitate față de familie
- este simplă și acceptabilă
- cuplul controlază propria fertilitate
- nu necesită control de specialitate
- nu costă
- poate ajuta cuplurile cu fertilitate redusă să obțină o sarcină (metoda calendarului).

#### **Dezavantaje:**

- sunt necesari instructori competenți
- limitarea sexului spontan
- necesită atenție sporită din partea femeii
- eficiență moderată.

#### **Indicații:**

- alternativă pentru cei care nu doresc să utilizeze alte metode din motive morale, culturale sau medicale
- pentru cei care utilizază metodele barieră doar în perioada fertilă a ciclului

#### **Contraindicații:**

- când partenerul nu dorește abstinență periodică
- femei care au suferit intervenții pe col sau cu secreții vaginale patologice.



#### **Diafragma**

##### **Contraindicații:**

- evaluare atență – antecedente de șoc toxic – septic, infecții repetitive ale tractului urinar, malformații sau afecțiuni vaginale sau uterine (prolaps uterin, tonus vaginal scăzut, obstrucții vaginale), nașterea unui copil la termen în urmă cu 6 săptămâni, alergie la latex sau sensibilitate la spermicide, lipsă de prinderile de manevrare a diafragmei.

**Efecte secundare:** infecții ale aparatului urinar, iritații locale, disconfort al partenerilor, secreții vaginale anormale sau mirosoitoare, leziuni vaginale.

**Avantaje:** necostisitor.

**Dezavantaje:** trebuie fixat de un medic, nu oferă protecție împotriva bolilor cu transmitere sexuală. Nu poate fi folosit pe durata menstruației pentru că există riscul unui șoc toxic.



#### **Spermicidele**

Sunt substanțe chimice care inactivează și distrug spermatozoizii, acoperă colul uterin și sunt reprezentate de: geluri, creme, ovule, tablete sau ovule efervescente și spume.

##### **Indicații:**

- când fertilitatea femeii este scăzută datorită vârstei sau lactației
- sarcina nu este riscață pentru sănătatea femeii
- se dorește asocierea cu diafragma sau prezervative.

##### **Contraindicații:**

- evaluarea atență – cele generale, în plus eficiența redusă și sensibilitatea la spermicide.

**Efecte secundare:** iritații locale date de sensibilitatea la spermicide sau alergie.

**Avantaje:** ușor de folosit, metodă necostisitoare.

**Dezavantaje:** crește riscul contactării unor boli cu transmisie sexuală.

## **Metodele de barieră**

Blochează intrarea spermatozoizilor în cavitatea uterină. Sunt reprezentate de: prezervative, diafragme, calotele (capisoanele) cervicale, buretii, spermicide (geluri, creme, ovule, tablete sau ovule spumante și spume).



**Avantaje:** inofensive, pot fi obținute fără prescripție medicală.

**Dezavantaje:** eficiență redusă.

### **Indicații:**

- contraindicații medicale pentru alte metode și când nu este dorită sterilizarea chirurgicală
- persoane care au contacte sexuale neregulate
- în timpul amenoreei de lactație
- după vasectomie
- când nu mai pot fi palpate firile sterilelului
- utilizarea de medicamente care interferează cu contraceptivele orale
- în timpul investigării unei afecțiuni ginecologice

### **Contraindicații:**

- evaluare atentă – imposibilitatea de a folosi constant o metodă de barieră, protecție împotriva sarcinii



## **Prezervative**

**Indicații:** împotriva sarcinilor nedorite și a bolilor cu transmitere sexuală.

**Contraindicații:** nici una

- evaluare atentă – cele generale, și în alergie sau sensibilitate la latex

**Efecte secundare:** alergie la latex

**Dezavantaje:** prezervativul nu poate fi reutilizat

## **Contracepția hormonală**

Metodele hormonale sunt de tip sistemic și sunt bazate fie pe o asociere de progestageni și estrogeni, fie doar pe progestageni: contraceptive orale combinate (COC), pilula numai cu progestageni (PNP), injectabilele numai cu progestageni (INP), contraceptivele injectabile combinate (CIC) și implantele subdermice, plasturi (patch-uri).



pilule contraceptive



plasture hormonal



inel vaginal

### **COC conțin estrogeni și progesteron sintetic care inhibă ovulația.**

**Indicații:** femei cu disertate antecedente – anemii postmenstruale, sarcină ectopică, menstruații dureroase, chisturi ovariene benigne recidivante, afecțiuni pelvine inflamatorii, antecedente familiale de cancer ovarian.

### **Contraindicații:**

- tulburări tromboembolice venoase, afecțiuni cerebrovasculare sau coronariene, complicații ale afecțiunilor cardiace valvulare, hipertensiune arterială cu sau fără complicații vasculare, afecțiuni maligne ale sănătății, migrenă, tumori hepatici, ciroză severă, complicații vasculare ale diabetului

zaharat, sarcină, mare fumătoare peste 35 ani, sângerări genitale de cauză nedagnosticată, hepatita virală acută.

- situatii speciale: lactația, perioada adolescenței, femei peste 35 ani, intervenții chirurgicale, interacțiuni medicamentoase (cu inductori enzimatici hepatici – risampicina, gricosulvina, anticonvulsivante – fenitoïna, carbamazepina, etosuximida, barbituricele), sângerări vaginale anormale, afecțiune malignă a aparatului genital, drepanocitoză, boli cu transmitere sexuală, boala varicoasă.

**Efecte secundare:** sângerări, dureri abdominale, grețuri, amețeli, creșterea în greutate, tensiune la nivelul sănilor, cefalee. La fumătoare, există risc major de infarct miocardic, accident vascular cerebral sau tromboză vasculară.

**Pilulele numai cu progestageni (PNP)** sunt preparate din grupul noretisteron sau din grupul norgestrel; inhibă penetrarea spermatozoizilor și suprimă vârful de descărcare de LH responsabil de producerea ovulației.

**Indicații:** femei care nu pot folosi sau acceptă pilulele combinate, care alăpteză, diabetice, obeze, cu hipertensiune, migrenă sau cu alte complicații determinate de componenta estrogenică a pilulelor combinate.

#### **Contraindicații:**

- afecțiuni maligne ale sănului, sarcină, sângerări genitale de cauză nedagnosticată,
- evaluare atentă – ciroză severă, tumori hepatice, hepatită virală acută,
- situatii speciale: lactația, perioada adolescenței, femei peste 35 ani, drepanocitoză, boala varicoasă.

**Avantaje:** eficiență sporită, nu interferă cu actul sexual, regleză tulburările de ciclu de cauză endocrină, previne cancerul de corp uterin și de ovar, permit dirijarea ciclului menstrual

**Dezavantaje:** riscul uitării cu posibilitatea apariției sarcinii, tulburări de ciclu menstrual, favorizează bolile cu transmitere sexuală, cresc incidența

## **Dispozitivele intrauterine (DIU)**

ACTIONEAZĂ prin inhibarea migrației spermatozoizilor în tractul genital superior feminin, inhibă transportul ovulului și fertilizarea.



**Indicații:** femei care necesită o metodă contraceptivă reversibilă cu durată lungă de acțiune, fără aplicare zilnică sau la fiecare contact sexual, care alăpteză, care ai dificultăți de aprovisionare cu contraceptive, risc crescut pentru folosirea metodelor hormonale (fumătoare, boală varicoasă etc.).

#### **Contraindicații:**

- cancer de corp sau col uterin, ovar, malformații uterine congenitale sau fibroame uterine, boli inflamatorii pelvine, sarcină sau suspiciune de sarcină, infecție puerperală sau avort septic recente, infecții severe ale tractului genital inferior, sângerări genitale anormale nedagnosticate, boală trofoblastică malignă, tuberculoză pelvină

- evaluare atentă – antecedente de boală inflamatorie pelvină, risc crescut pentru boală cu transmitere sexuală, HIV/SIDA, boală trofoblastică benignă, intervalul 48 ore – 4 săptămâni după naștere, hepatită virală activă, ciroză severă, tumori hepatice

- situatii speciale – nuliparitatea, sângerări vaginale anormale, boală cu transmitere sexuală, inclusiv HIV.

**Efecte secundare:** dureri abdominale colicative, secreție vaginală, menstruații abundente.

**Complicații:** perforație, sângerări excesive, boala inflamatorie pelvină, sarcină.

● evaluare atentă – risc de boală cu transmitere sexuală (parteneri sexuali mulți), viol.

## Buretele contraceptiv



Buretele contraceptiv este făcut dintr-un material spongios și conține spermicide. Se introduce în interiorul colului uterin cu 24 de ore înainte de contactul sexual. Dar, spre deosebire de neplăcuta diafragmă sub formă de căpăcel de plastic, nu este nevoie ca buretele să fie fixat de către un medic.

### Avantaje:

- nu are nevoie de prescripție medicală,
- eficiență imediată.

### Dezavantaje:

- greu de pozițional corect,
- nu oferă protecție împotriva bolilor cu transmitere sexuală și
- nu poate fi folosit pe durata menstruației.

cancerului, creștere în greutate, agravararea unor disfuncții endocrine, tromboză și embolie, céfalee.

### Produse injectabile numai cu progestageni (INP)

Sunt preparate din medroxiprogesteron acetat depozit (DMPA) sau noretisteron enantat (NLT - EN); inhibă penetrarea spermatozoizilor și suprimă vârful LH responsabil de ovulație.



**Indicații:** femei care doresc metodă contraceptivă cu eficiență mare, care alăptăză, au probleme cu administrarea zilnică a contraceptivelor orale, au drepanocitoză sau au contraindicație pentru contraceptive cu estrogen.

### Contraindicații:

- afecțiuni maligne ale sănului, diagnostic sau suspiciune de sarcină, sângerări genitale anormale de cauză nediagnosticată.
- evaluare specială – diabet zaharat cu complicații vasculare, afecțiuni cerebrovasculare sau coronariene, afecțiune hepatică acută, hipertensiune severă cu sau fără complicații vasculare, ciroză severă, tumori hepatice, iar ca situări speciale – alăptat, perioada adolescenței, femei peste 35 ani, interacțiuni medicamentoase (cu antibioticice – rifampicina, griseofulvina, cu anticonvulsivante – fenitoïna, carbamazepina, clonazepam, barbituricale), sângerări vaginale anormale, afecțiune malignă a aparatului genital, drepanocitoză, boală cu transmitere sexuală.

**Efecte secundare:** perturbarea ciclurilor menstruale, amenoree, creștere în greutate, céfalee.

**Contraceptivele injectabile combine (CIC)** conțin cyclofem/cycloprovera sau mesigyna; acționează prin suprimarea ovulației, pe mucusul cervical, făcându-l nefavorabil penetrării spermatozoizilor.

**Indicații:** femei care doresc o metodă contraceptivă cu eficiență ridicată, fără săngerări neregulate, cu probleme în administrare corectă a contraceptivelor orale.

**Contraindicații:**

- tulburări tromboembolice venoase, afecțiuni cerebrovasculare sau coronariene, afecțiuni cardiace valvulare complicate, hipertensiune arterială severă, cu sau fără complicații vasculare, migrenă focală, afecțiuni maligne ale sânului, diabet zaharat cu complicații vasculare, sarcină cunoscută sau suspectată, afecțiune hepatică acută (hepatită virală acută)
- evaluare specială – mare sumătoare, vîrstă peste 35 ani, hipertensiune moderată, tumori hepatice, ciroză, săngerări genitale de cauză nedagnosticată, iar ca situații speciale – lactația, perioada adolescenței, femei peste 35 ani, intervenții chirurgicale, drepanocitoză, boala varicoasă.

**Efecte secundare:** modificări ale ciclurilor menstruale, amenoree, creștere în greutate, céfalee și amețeli.

**Implantele subdermice NORPLANT**

Sunt pe bază de o doză mică de progestagen, cu durată lungă de acțiune (3-5 ani) și reversibilă; acționează asupra mucusului cervical, inhibând penetrarea spermatozoizilor și suprimă vârful de descărcare al LH responsabil de producerea ovulației.



**Indicații:**

- femei care doresc o metodă contraceptivă cu eficiență ridicată, activă pe termen lung, care să nu fie legată de coit, nu trebuie administrată zilnic și nu necesită aprovizionare
- femei care nu doresc sterilizare
- femei care nu pot folosi contraceptive care conțin estrogeni.

**Contraindicații:**

- cele ale pilulelor combine
- afecțiuni maligne ale sânului
- diagnostic sau suspiciune de sarcină
- săngerări genitale anormale nedagnosticate
- evaluare specială – hepatita infecțioasă, ciroză severă, tumoră hepatică, femei cu hipertensiune arterială cu sau fără complicații vasculare, diabet zaharat, cardiopatie ischemică, antecedente de infarct miocardic, migrenă
- situatii speciale – identice cu ale injectabilor numai pe bază de progestagen.

**Efecte secundare:** tulburări ale ciclurilor menstruale, amenoree, céfalee, nervozitate, grețuri, amețeli, creșteri în greutate, acnee.

**Avantaje:** durată mare de protecție – 3-5 ani, rată mică de eșec.

**Dezavantaje:** destul de scump, poate cauza efecte secundare, inclusiv săngerări neregulate. Nu oferă protecție împotriva bolilor cu transmitere sexuală.