

MENTS ÉLETET 2019


A kezek higiéniája MÁJUS 5



A TISZTA ÁPOLÁS
A TI KEZETEK BEN VAN

#A kezek higiéniája #Fertőzések ellenőrzése
Egészség mindenkinek

Az egészségügyi ellátással társuló fertőzések előfordulásának gyakorisága Romániában a 1995-2016³ közötti időszakban



AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL TÁRSULÓ FERTŐZÉSEK (EETF)

Az egészségügyi ellátással társuló fertőzések, melyek „noszokomiális” vagy „kórházi” fertőzéseként is ismertek, azokat a fertőzéseket jelentik, amelyek egy betegnél jelennek meg az egészségügyi ellátási folyamat során egy kórházban vagy egészségügyi egységben, fertőzés, mely nem volt jelen vagy nem lappangott a felvétel időpontjában.

Az EETF bármilyen olyan kerettípusban érintheti a betegeket, ahol ezek ellátásban részesülnek és elbocsátás után is jelentkezhetnek. Sőt, ezek az EETF-ek magukban foglalják a foglalkoztatási fertőzéseket az orvosi-egészségügyi személyzet körében. Az EETF a leggyakoribb ellenhatás az orvosi szolgáltatások nyújtásának ideje alatt és a jelen pillanatig egyetlen orvosi intézmény vagy ország nem jelentheti ki, hogy megoldotta ezt a problémát.¹

A Fertőzések Megelőzési és Ellenőrzési Programjai

Mindegyik egészségügyi egységben alkalmazásra került egy fertőzés-megelőzési és ellenőrzési program (FME), amely szükségletek függvényében változik. Számos megelőzési és ellenőrzési intézkedés egyszerű és olcsó, viszont felelősséget és a beidegződött magatartások változását követeli meg az egészségügyi személyzet rutinjában – a kezek higiéniájának fokozása, a szabványos elővigyázatossági intézkedések betartása, stb.²

Az EETF Romániában

Az 1995-2015 évekre jegyzett eredmények az EETF előfordulási gyakoriságának rendkívül alacsony szintjét mutatja, ezek típusú fertőzés romániai kórházakban való alul-jelentése és alul-diagnosztizálása miatt.

A 2015. évre számított előfordulási gyakoriság 0,33%. Az EETF 2016-ban is egy alulbecsült kórtan maradt, az elbocsátott betegek összességének 0,44%-os számolt átlagos előfordulási gyakoriságával, a romániai kórházak többségének statisztikai jelentései alapján.³

A 2017. évben jelentett EETF száma 19607 eset volt, melyből a legtöbb emésztési (8019), légzési (3549), húgyúti (2568) és műtéti seb (2297). A legtöbb EETF esetet Bukarestben (5246 eset) és Iași (2469 eset), Kolozs (1720) és Temes (1525) megyékben jelentették.⁴

3. CARMIN-ROM 2016 <http://www.cnsctb.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/infectii-nosocomiale-1/961-consumul-de-antibiotice-rezistente-microbiana-si-infectiile-asociate-asistentei-medice-in-romania-2016/file>

4. INSP-CNSISP, <http://cnsisp.insp.gov.ro/?q=content/date-statistice-0>

AZ EETF Európában

Az EETF átlagban a betegek 7%-át érinti a fejlett országokban, illetve a betegek 15%-át a gyengén és közepesen fejlett országokban.

Európában feltételezhetően kb. 80000 kórházi beteg szenved legalább egyszer EETF-ben, bármely adott napon. A fertőzések megelőzésének és ellenőrzésének egyszerű és olcsó intézkedései (FME), mint a kezek megfelelő tisztán tartása, > 50%-al csökkentheti az EETF gyakoriságát.⁵

A 2016. évben 15 ország jelentett 1159 kórházból és 1451 Intenzív Terápiás osztályból gyűjtött adatokat: Belgium, Csehország, Észtország, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Spanyolország és Skócia.⁶

5. EVSz:



EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTERIUM



ORSZÁGOS
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZET



EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ÉS -
ÉRTÉKELÉS ORSZÁGOS
KÖZPONT



KÖZEGÉSZSÉGÜGYI
IGAZGATÓSÁG REGIONÁLIS
KÖZPONTJA TEMESVÁR

Logó
Közegészségügyi
Igazgatóság

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI
IGAZGATÓSÁG
MEGYE