




CAMPANIA

„Sănătatea mintală - parte integrantă și esențială a sănătății”

IANUARIE 2023

LA NIVEL GLOBAL

1 din **8** persoane suferă de o tulburare mintală, femeile fiind afectate într-un procent mai mare decât bărbații.¹



1 din **10** femei suferă de depresie postnatală în primul an după naștere.

1 din **1000** de femei dezvoltă o afecțiune mai gravă numită psihoză postpartum.²



Comparând datele din România și Europa Centrală se observă că nr. total de cazuri de anxietate a fost în creștere în perioada 2010-2019, pornind de la o rată a prevalenței mult mai mică comparativ Europa Centrală și atingând aproape același nivel în anul 2019.

Prevalența anxietății % comparativ România-Europa Centrală, în perioada 2010-2019³



În perioada 2010-2019, prevalența depresiei în România, pe genuri înregistrează un platou aproximativ, la femei aproape dublu față de bărbați.

Prevalența depresiei (%) în România, pe genuri, în perioada 2010-2019³



Prevalența tulburărilor mintale și de comportament în România a crescut constant în ultimii 10 ani, astfel de la valoarea de 1566,3⁰/₀₀₀₀ de locuitori în anul 2012 a ajuns la o valoare aproape dublă de 2889,9⁰/₀₀₀₀ de locuitori, în anul 2021.

Prevalența (rate la ⁰/₀₀₀₀ de locuitori) tulburărilor mintale și de comportament (cod ICD 10 F00-F99), în România, în perioada 2012-2021⁴



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ



CENTRUL NAȚIONAL DE SUPRAVEGHERE A BOLILOR NETRANSMISIBILE



CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TÎRGU MUREȘ

¹World Mental Health for All. Transforming mental health for all
²<https://www.webmd.com/depression/guide/postpartum-depression#091e9c5e800088af-1-1>

³<https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/>

⁴INSP-CNSSP